

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 3-5-94356836

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE"

(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35000 RENNES — Tél. (99) 36.01.74

ABONNEMENT ANNUEL :

50 F

Sous-Régisseur de recettes de la D. D. A.

PROTECTION DES VÉGÉTAUX

C. C. P. RENNES 9404-94 Y

Supplément au bulletin n° 75

(Bulletin céréales n° 3)

17 MARS 1983

BLE D'HIVER

STADE VEGETATIF

Les températures de ces derniers jours ont favorisé le développement des cultures, certaines ont atteint le stade "épi 1 cm". Les situations rencontrées cette année, présentent toutefois une grande diversité. La majorité des parcelles sont en cours de tallage.

DENSITE

Les densités sont également très variables en raison des difficultés au semis.

Le nombre de plants par m² étant pris en compte pour décider des traitements fongicides, effectuez sans tarder, un comptage, si cela n'a pas déjà été fait :

- comptez le nombre de pieds sur 2 mètres linéaires en 5 endroits différents;
- divisez le total obtenu par 1,7 pour un écartement de 17 cm (1,8 pour 18 cm, etc ...)
- lorsque le blé est déjà au tallage, il est nécessaire d'arracher des plants pour les distinguer entre eux.

MALADIES DU PIED

Le piétin verse n'a pas encore été signalé, mais les conditions climatiques sont favorables aux contaminations.

Surveillez, dès à présent, les parcelles ayant atteint le redressement. Effectuez un sondage en prélevant 2 maîtres-brins au hasard en 20 endroits différents.

TRAITEMENTS FONGICIDES

Un traitement précoce du redressement au stade "1 noeud" ne se justifie que lorsque 20 talles (50 %) sont touchées profondément. Cette situation est habituellement exceptionnelle, elle n'a encore pas été rencontrée cette année.

Si le seuil d'intervention était atteint, utilisez une spécialité à base de bénomyl ou de carbendazime.

En l'absence de piétin verse ou pour un faible niveau d'attaque, l'emploi préventif d'un fongicide seul ou associé à un raccourcisseur de croissance est déconseillé au redressement.

P.1.20

ORGE D'HIVER

La RHYNCHOSPORIOSE est observée dans la majorité des cultures. Si les conditions climatiques demeurent favorables à son développement (temps frais et humide) un traitement devra être envisagé contre cette maladie au début de la montaison (stade 1 noeud).

JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE (J.N.O.)

La présence des pucerons responsables des contaminations de J.N.O. sur orge blé et avoine a jusqu'ici été rarement décelée, il est cependant nécessaire de poursuivre la surveillance des cultures (semis précoces).

Une intervention insecticide ne se justifie que lorsque 1 pied sur 5 porte un ou plusieurs pucerons. Cette situation est exceptionnelle.

Une prospection J.N.O. est en cours. En cas de dépérissement suspect ou en présence de pucerons, adressez pour analyse un échantillon de 20 plants (4 plants prélevés en 5 endroits différents) au G.R.I.S.P.- Domaine de la Motte-au-Vicomte - B.P. 29 - 35650 LE RHEU.

DESHERBAGE EN FIN D'HIVER

RECTIFICATIF

Nous vous prions de nous excuser pour l'erreur qui s'est glissée dans notre dernier bulletin (n° 74 du 24 février 1983) :

1'Illoxan CE (dichlofop méthyl) est utilisable sur blé et orge d'hiver à 2 l/ha jusqu'au stade 1 noeud.